

Ernst Henning.

Bestimmungstabellen für
Gräser und Hülsenfrüchte
im Blütenlosen Zustande.

BESTIMMUNGSTABELLEN FÜR GRÄSER UND HÜLSENFRÜCHTE IM BLÜTENLOSEN ZUSTANDE

VON

PROFESSOR DR. ERNST HENNING

WEIL. CHEF DER BOTAN. ABT. DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN
CENTRALVERSUCHSANSTALT ZU STOCKHOLM

INS DEUTSCHE ÜBERTRAGEN VON

DR. F. v. MEISSNER

MIT EINEM VORWORT VON

A. ELOFSON

DIREKTOR DES SCHWED. REICHSVEREINS FÜR
WIESEN- UND WEIDENBAU, STAATSKONSULENT
FÜR PFLANZENBAU

MIT 2 ABBILDUNGEN UND 7 TAFELN



BERLIN

VERLAG VON JULIUS SPRINGER

1930

Germany

Bo
H

BESTIMMUNGSTABELLEN FÜR GRÄSER UND HÜLSENFRÜCHTE IM BLÜTENLOSEN ZUSTANDE

VON

PROFESSOR DR. ERNST HENNING
WEIL. CHEF DER BOTAN. ABT. DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN
CENTRALVERSUCHSANSTALT ZU STOCKHOLM

INS DEUTSCHE ÜBERTRAGEN VON
DR. F. v. MEISSNER

MIT EINEM VORWORT VON
A. ELOFSON
DIREKTOR DES SCHWED. REICHSVEREINS FÜR
WIESEN- UND WEIDENBAU, STAATSKONSULENT
FÜR PFLANZENBAU

MIT 2 ABBILDUNGEN UND 7 TAFELN



BERLIN
VERLAG VON JULIUS SPRINGER
1930

245960
11. 8. 30.



ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

Vorwort.

Obwohl eine genügende Kenntnis der Wiesen- und Weidenpflanzen die Grundbedingung ihrer zweckmäßigen Verwendung bildet, müssen wir leider gestehen, daß diese Kenntnis im großen und ganzen immer noch recht mangelhaft ist, namentlich was die Grasarten auf unseren Weiden betrifft. Alles was getan werden kann, um diesem Mangel unseres Wissens abzuhelpfen, ist deshalb empfehlenswert. Die von Professor HENNING für seine agrikulturbotanische Unterrichtstätigkeit aufgestellten Tabellen zur Bestimmung dieser Pflanzen sind im Auftrage des Schwedischen Reichsvereins für Wiesen- und Weidenbau weiter ergänzt und in dem Jahrbuch des Vereins 1927 veröffentlicht worden. Da die HENNINGSchen Tabellen als ein wertvolles, die neuzeitliche Arbeit für die Weidekultur ergänzendes Glied angesehen werden können, um so mehr als sie nach wesentlich anderen Prinzipien aufgestellt sind als die sonst im Buchhandel zugänglichen Leitfäden auf diesem Gebiete, dürfte eine Übersetzung ins Deutsche nicht nur von praktischem Wert sein, sondern auch für die Forschung zur Vereinfachung und Vervollständigung der Bestimmungsmöglichkeiten beitragen. Aus diesem Grunde wird die Arbeit sowohl allen interessierten praktischen Landwirten als auch den Forschern auf dem Gebiete der Agrikulturbotanik empfohlen.

U p s a l a, im Oktober 1929.

A. ELOFSON.

Dir. des Schwed. Reichsvereins für
Wiesen- und Weidenbau, Staats-
konsulent für Pflanzenbau.

Inhaltsverzeichnis.

	Seite
Einleitung	I
Die vegetativen Organe der Gräser	3
Die vegetativen Organe der Hülsenfrüchte	II
Bestimmungstabelle für Gräser im blütenlosen Zustande . .	14
Bestimmungstabelle für Hülsenfrüchte im blütenlosen Zu- stande	31
Verzeichnis der deutschen Namen	37
Verzeichnis der lateinischen Namen	39
Tafel I—VII	

Einleitung.

Der erste, der einen Versuch unternahm, eine systematische Übersicht über Gräser im blütenlosen Stadium zu liefern, war JESSEN in seiner Arbeit „Deutschlands Gräser“, 1863. In größeren Floren findet man wohl viele wertvolle Angaben über die vegetativen Organe der Gräser, die Aufstellung in diesen Werken muß sich aber naturgemäß hauptsächlich auf die *Blütenteile* beziehen, da sich Gruppen und Gattungen in der Familie der Gräser voneinander wesentlich in der verschiedenen Ausbildung der Blütenteile unterscheiden. Die gewöhnlichen Floren helfen einem daher wenig, wenn man die Gräser im vegetativen Stadium bestimmen will. Die wichtigste hierhergehörige Arbeit ist die des Dänen SAMSÖ LUND, dessen klassisches Werk „Vejledning til at kjende Graeser i blomsterlos Tilstand“ („Anleitung zur Bestimmung von Gräsern im blütenlosen Zustande“) im Jahre 1882 erschien. Später erschienene Schriften auf diesem Gebiete sind im wesentlichen Bearbeitungen und Vereinfachungen dieses Werkes. Nähere Angaben über diesbezügliche Literatur findet man in WITTMACK, Botanik der kulturtechnisch und landwirtschaftlich wichtigen Pflanzen, S. 244, 1924.

In vorliegender Arbeit habe ich in erster Linie den schwedischen Verhältnissen Rechnung getragen. Seltenere Gebirgsgräser sowie eingeschleppte Gräser, die auf Lastplätze lokal beschränkt sind, habe ich jedoch ausgelassen. Die Arbeit fußt im wesentlichen auf SAMSÖ LUNDS grundlegendem Werk. Die Vorkenntnisse, die nötig sind, um sich der Bestimmungstabelle bedienen zu können, sind nicht groß. Man muß wohl den allgemeinen äußeren Bau der vegetativen Organe der Gräser kennen, über den im Folgenden berichtet wird, ferner die Aufstellung einer Flora verstehen und womöglich auch einige Übung im Bestimmen von Pflanzen haben. Diese Vorkenntnisse sind aber nicht größer, als daß sie sich nicht beinahe jeder Landmann selbst aneignen kann.

Bei der Aufstellung der Tabelle habe ich mich bemüht, die sog. dichotomische Methode streng durchzuführen, so daß in

erster Linie die Gegensätze in den Eigenschaften der einzelnen Arten stark hervortreten. Eine vollständige Beschreibung der vegetativen Organe der einzelnen Arten dürfte überflüssig sein; in einigen Fällen sind aber eine Reihe von ergänzenden Angaben mitgeteilt, welche die Bestimmung erleichtern können.

Nach den Gräsern sind die Hülsenfrüchte die wichtigsten Futterpflanzen auf unseren Weiden. Da es vielfach von Wert sein kann, auch diese Pflanzen im blütenlosen Stadium zu bestimmen, habe ich auch über sie eine Bestimmungstabelle mit einleitender Erklärung über die Fachausdrücke ausgearbeitet.

Für diejenigen, welche versuchen wollen, die Bestimmung von Gräsern und Hülsenfrüchten nach den folgenden Tabellen selbst zu erlernen, sei betont, daß

I sein Gegenstück in II,

a_1 „ „ „ b_1 ,

a_2 „ „ „ b_2

hat usw.

An Hand gewöhnlicher Floren ist es, wie oben erwähnt, fast unmöglich, Gräser zu bestimmen, deren Blüten nicht entwickelt sind. Ich glaube daher, daß die folgenden Bestimmungstabellen auch für Botaniker von Wert sein können, da ja nur ganz wenige Arten von schwedischen Gräsern und Hülsenfrüchten in den Tabellen fehlen. Bei pflanzenphysiognomischen Studien sind Kenntnisse auf diesem Gebiete unbedingt notwendig, sollen die Beschreibungen über die Pflanzengesellschaften (Pflanzenassoziationen) so vollständig und zuverlässig als möglich werden.

Die meisten auf den Tafeln wiedergegebenen Bilder sind der Arbeit SAMSÖ LUNDS entnommen, Abb. I auf Tafel I sowie Abb. II auf Tafel II stammen aus FALKES Arbeit „Die Dauerweiden“, 2. Aufl. 1911. Die lateinischen Namen decken sich mit denen in KROK und ALMQUISTS Schulflora und die deutschen im großen und ganzen mit denen in GORCKES Flora.

Die vegetativen Organe der Gräser.

Bevor ich die Bestimmungstabelle mitteile, will ich über den Bau der vegetativen Organe der Gräser sowie über die wissenschaftlichen Ausdrücke berichten, die auf diesem Gebiete benutzt werden.

Hinsichtlich des wirklichen Wurzelsystems der Gräser ist zu beachten, daß man bei ihnen nicht von einer Hauptwurzel mit Wurzelzweigen sprechen kann. Beim Keimen des Grassamens (eigentlich der Grasfrucht) bilden sich fast gleichzeitig mehrere gleichwertige Wurzelfasern; das Wurzelsystem besteht somit nur aus sog. Nebenwurzeln; das beim Keimen zuerst hervorbrechende Würzelchen wird nicht kräftiger als die folgenden Wurzelfasern. Nebenwurzeln entstehen jedoch nicht nur während des Keimens; sie können sich auch später an über oder unter der Erde liegenden Trieben entwickeln. Die Entwicklung des Wurzelsystems und der unterirdischen Triebe wird natürlich verschieden, je nachdem die Gräser ein-, zwei- oder mehrjährig werden. Von unterirdischen Trieben kann man gewöhnlich nur bei mehrjährigen Gräsern sprechen. Werden jedoch Samen von ein- oder zweijährigen Gräsern tiefer in die Erde gesät, so kommt die ursprüngliche, primäre Triebachse ein längeres oder kürzeres Stück tief unter der Oberfläche zu liegen und an ihr können sich auch Zweige bilden, die dann teilweise unter der Erde liegen.

Die über der Erde befindlichen „Stengel“ der Gräser nennt man in der Alltagssprache Halme (Grashalme). Die Grashalme sind besonders dadurch gekennzeichnet, daß an ihnen ein oder in der Regel mehrere angeschwollene Gelenke vorkommen, sog. Halmknoten, an denen die Blattscheiden befestigt sitzen. Die Halme der Gräser sind hohl, mit Ausnahme der eigentlichen Halmknoten, die, wie sich bei einem Schnitt zeigt, aus einer dichten, festen Masse (Gewebe) bestehen. Die Grashalme verzweigen sich in der Regel nur an der Basis, d. h. an der Erdoberfläche oder an der Spitze, d. h. im Blütenstand. Ganz wie bei anderen Pflanzen entwickeln sich die Zweige an der Halmbasis in den

Blattfalten, d. h. in den Winkeln zwischen Blatt und Halm. In den Fällen, wo die Blätter, wie dies bei unterirdischen Triebteilen gewöhnlich der Fall ist, nur aus kleineren oder größeren Schuppen bestehen, entwickeln sich die Zweige in den Winkeln zwischen diesen und den Halmen. Da die an unterirdischen Trieben befindlichen Schuppen gewöhnlich bald verwelken oder einschrumpfen, machen diese Triebe den Eindruck von Wurzeln. Nach der botanischen Terminologie sind sie aber Wurzelstöcke. Die Verzweigung an der Basis des Grashalmes pflegt man Bestockung zu nennen. Die Bestockung wird in der Regel um so stärker, je öfter das Gras gemäht oder abgeweidet wird, doch verhalten sich die einzelnen Grasarten diesbezüglich recht verschieden. Bei einjährigen Gräsern, z. B. bei Gerste, Hafer usw., entwickeln sich die Seitentriebe fast gleichzeitig mit dem primären Haupttriebe, so daß ihre Früchte nahezu gleichzeitig zur Blüte und Reife gelangen. Bei mehrjährigen Gräsern entwickeln sich die Seitentriebe so langsam, daß sie in der Regel nicht vor dem nächsten Jahre zur Blüte gelangen, sofern das Gras nicht zeitig gemäht oder abgeweidet wird. Ein Gras, das noch im Hochsommer eine größere oder kleinere Anzahl steriler, d. h. blütenloser, keine Halme hervorbringender Seitentriebe, sog. Blatttriebe hat, ist daher mehrjährig¹. Je leichter ein mehrjähriges Gras nach dem Mähen oder Abweiden Seitentriebe entwickelt, desto größeren Wert hat es, da der Bestand hierdurch dichter wird.

Glatthafer ist ein Gras mit reichem Nachwuchs, auch Wiesen-schwingel und Knaulgras haben einen recht guten Nachwuchs, jedenfalls einen besseren als Timothee. Eigentümlich ist, daß sich bei Hainrispengras (*Poa nemoralis*), das ja ein mehrjähriges Gras ist, keine sterilen Seitentriebe vom Wurzelstock entwickeln.

Die Wurzelstöcke sind im allgemeinen kurz und ihre Triebe sitzen so dicht nebeneinander, daß die Gräser mehr oder weniger dichte Horste bilden, z. B. Timothee, Knaulgras, Weidelgras und Rasenschmiele. Der kurze Wurzelstock bildet jährlich blüten-

¹ Man sagt, unsere Herbstgetreidearten sind zweijährig, wiewohl sie nicht länger als 11—12 Monate leben. Sie müssen ja in dem einen Jahre gesät werden, um im nächsten geerntet zu werden. Johannesroggen wird ja bereits im Juni gesät, bildet im Spätsommer und Herbst einen blattrreichen Horst ohne Halme und kann daher fehlerhaft als mehrjähriges Gras betrachtet werden.

tragende Triebe, die im vorhergehenden Jahre in der Regel sterile Blatttriebe waren, weiters neue Blatttriebe und neue Wurzeln. Das Gegenstück des kurzen Wurzelstockes ist der kriechende Wurzelstock, bei dem wenigstens einzelne Zweige zu langen kriechenden Trieben mit größeren oder kleineren Abständen zwischen den „Gliedern“ entwickelt sind; besonders deutlich ist dies beispielsweise beim Schilfrohr, der echten Quecke, der grannenlosen Trespe und dem Wiesenrispengras zu beobachten. Bei ersterwähntem können die Wurzelstöcke mehr als meterlang werden. Diese kriechenden, langgliedrigen Wurzelstöcke werden gewöhnlich unterirdische Ausläufer genannt. Jeder Zweig an einem solchen Ausläufer biegt sich allmählich gegen die Erdoberfläche und bildet hier Blatttriebe in kleinen Horsten. Während der kurze Wurzelstock dichte Horste bildet, bilden die unterirdischen Ausläufer dünne, kleinere Horste. Natürlich haben Gräser mit unterirdischen Ausläufern eine größere Fähigkeit, sich in einem Grasboden auszubreiten als Gräser mit kurzem Wurzelstock.

Einige Gräser bilden überirdische Ausläufer, z. B. gem. Rispengras. Von dem Horst werden nämlich längs der Erdoberfläche kriechende Zweige ausgeschickt, die an ihren Gelenksknoten teils Wurzeln, teils Blattbüschel bilden, die sich allmählich zu neuen Horsten entwickeln. Einzelne Formen von Fioringras haben sowohl über- als unterirdische Ausläufer. Bei gewissen Gräsern, z. B. lanzettlichem Schilf, können Zweige von hoch droben an den Halmen sitzenden Halmknoten ausgehen.

Die verschiedene Entwicklung der Blätter bei den Gräsern muß natürlich reiche Möglichkeiten bieten, diese Pflanzen im blütenlosen Zustande bestimmen zu können. Zu beachten ist zunächst, daß die Halmblätter bei den Gräsern in 2 Reihen auf dem Halm stehen, während sie bei den Riedgräsern in 3 Reihen stehen. Blätter, die vom Wurzelstock ausgehen, werden „Wurzelblätter“ genannt.

Die Blätter der Gräser bestehen in der Regel aus *Blattscheide*, *Spreite* und *Blatthäutchen*; letzteres ist gewöhnlich ein häutchenartiges Organ, das an der Grenze zwischen Scheide und Spreite sitzt und als eine Fortsetzung der Haut auf der Innenseite der Scheide betrachtet werden kann. Ein Blattstiel fehlt immer. Die kleinen Schuppen, die, wie oben erwähnt, an den unterirdischen Ausläufern vorkommen, sind als zusammengeschrumpfte Scheiden

zu betrachten; diesen Blattgebilden fehlen demnach Spreiten. Bei Waldschwingel finden wir mehrere auffällig große, blasse Scheiden ohne Blattscheiben an der Halmbasis. Die Blattscheide umschließt den Halm wie ein Rohr. Sie ist in der Regel „offen“, d. h. ihre Kanten sind nicht miteinander verwachsen; die Scheide kann daher mit einem zusammengerollten Papier verglichen werden. Es gibt jedoch Gräser mit mehr oder weniger vollständig geschlossenen Scheiden, wie Arten von Perlgras, Trespe usw. Zu beachten ist, daß bei mehreren Gräsern die Blattscheiden in jungem Zustande geschlossen sind, aber von an ihrer Innenseite hervorbrechenden Trieben gesprengt werden. Gewöhnlich hat die Scheide die Form eines Rohres, bei gewissen Arten ist sie aber stark zusammengedrückt, wie bei Knaulgras, Waldrispengras, zu-




Abb. 1. Blattgrund und Blatthäutchen bei 1. *Milium*, 2. *Melica nutans*, 3. *Avena elatior*, 4. *Phragmites*, 5. *Melica uniflora*.

sammengedrücktem Rispengras usw. Ebenso wie die Blattspreite selbst wird auch die Scheide von einer Menge parallel laufender Adern („Nerven“) durchzogen, unter denen sich diejenige, welche dem Mittelnerv der Spreite entspricht, oft scharf in Form eines Kiels abzeichnet, z. B. bei Knaulgras, Flattergras, Schmieie und Trespe. Bei mehreren Gräsern finden wir zwischen den Adern eine Menge von Querverbindungen, sog. Anastomosen (Tafel II, 10; III, 3), die sich deutlich abzeichnen, wenn man die Scheide gegen das Licht hält, z. B. bei Arten von Schwaden und beim Rohrglanzgras. Auf der Außenseite kann die Scheide glatt, weich- oder harthaarig sein. Auf der Innenseite ist die Scheide immer glatt und eben, fast spiegelblank.

Das Blatthäutchen fehlt bei schwedischen Gräsern nie gänzlich, es kann aber bei gewissen Arten in Haare aufgelöst sein, wie bei Dreizahn, Pfeifengras und Schilfrohr. Das Häutchen ist

gewöhnlich dünn und blaß, selten steif und grün oder violett. Es ist an der Spitze meist stumpf, z. B. bei gemeinem Straußgras und Wiesenrispengras, kann aber auch abgerundet sein, z. B. bei Knaulgras; bei vielen ist es lang ausgezogen und spitz, z. B. bei Fioringras, gemeinem Rispengras und Wiesenfuchsschwanz. Im allgemeinen ist das Blatthäutchen am längsten beim obersten Blatt an einem Halm. Mitunter ist es an der Spitze gezähnt, wie bei Timothee, Glatthafer, wolligem Honiggras, weichhaariger und Feldtrespe. Seltener ist es haarig, z. B. bei wolligem Honiggras, Waldzwenke, Glatthafer und Wiesenfuchsschwanz.

Man kann sich im Voraus vorstellen, daß die Blattspreite selbst etliche Merkmale darbieten muß, wenn es sich darum handelt, blütenlose Gräser voneinander zu unterscheiden. Man kann zunächst nach der sog. Knospenlage der Blattspreite zwischen zwei Hauptgruppen von Gräsern unterscheiden (Tafel I, a_2 und b_2). Die eine Gruppe hat die Blattkanten im Knospenstadium eingerollt, so daß die Blätter in diesem Stadium einem schmalen, zusammengerollten Papier gleichen, bei dem die eine Kante die andere überdeckt; bei der anderen Gruppe dagegen sind beide Blatthälften gegeneinander gefaltet und sehen daher einem schmalen, in der Mitte gefalteten Papierstreifen ähnlich. Wenn die Blätter vollständig entwickelt sind, sind die Blatthälften sowohl bei Blättern mit zusammengerollter als mit gefalteter Knospenlage mehr oder weniger vollständig ausgebreitet. Einzelne Gräser mit gefalteter Knospenlage besitzen indessen die Fähigkeit, bei Feuchtigkeitsmangel die beiden Blatthälften zusammenzurollen oder zusammenzufalten, nachdem die Blattspreiten bereits ihre volle Entwicklung erfahren haben. Bei Feuchtigkeitsmangel verdunstet das Wasser in gewissen, auf oder neben dem „Mittelnerv“ oder auch neben den anderen Blatt„nerven“ liegenden, großen Hautzellen, „Gelenkzellen“, wodurch sich die Blatthälften gegeneinander biegen; bei Zufuhr von Feuchtigkeit saugen diese Zellen wieder Feuchtigkeit an und die Blatthälften trennen sich wieder. Derartige Zellen liegen bei den Rispengrasarten zu beiden Seiten des Mittelnerves (Tafel IV, 2), bei *Glyceria*-Arten und Knaulgras über dem Mittelnerv, bei Dreizahn, Fioringras usw. auch zwischen den Seitennerven. Verschiedene Arten der gleichen Gräsergattung haben gewöhnlich die gleiche Knospenlage, welsches Weidelgras hat jedoch eine eingerollte Knospenlage, deutsches Weidelgras

eine gefaltete. Die Trespenarten haben im allgemeinen eine eingerollte Knospenlage, die aufrechte Trespe hat eine gefaltete. Bei Blättern der gleichen Art wechselt die Knospenlage selten. Bei schwachen Blättern von welschem Weidelgras und bei Wiesen-schwingel kann die Knospenlage gefaltet sein, obgleich sie in der Regel eingerollt ist. Andererseits kann bei sehr kräftigen Blättern von deutschem Weidelgras die Knospenlage gerollt statt gefaltet sein. Ähnliches finden wir auch bei Hundstraußgras. Bei gewissen Gräsern bleibt die Faltung der Blatthälfte bestehen, d. h. die Blatthälften biegen sich nie voneinander, nämlich bei Gräsern mit mehr oder weniger fadenschmalen oder borstenähnlichen Blättern, wie geschlängelte Schmiele, Schafschwingel und Borstengras. Die Faltung tritt bei diesen in Form einer mehr oder weniger deutlichen Rinne auf der Oberseite zutage. Im allgemeinen sind diese Blätter zusammengepreßt oder 5—6kantig (Tafel I, 2, Tafel II, 1).

Die Form der Blattspreiten wechselt ja im großen und ganzen wenig. In der Regel ist sie fast ihre ganze Länge entlang gleichbreit, z. B. bei Wiesenrispengras und Rotschwingel, in einzelnen Fällen, wie erwähnt, sogar nahezu fadenähnlich, wie bei geschlängelter Schmiele und Schafschwingel. In anderen Fällen liegt die größte Breite dicht unterhalb der Mitte des Blattes, z. B. bei Ruchgras, mitunter liegt sie ungefähr in der Mitte, so daß die Blattspreite sowohl aufwärts als abwärts schmaler wird, wie bei Rohrarten und Flattergras, seltener an der Basis selbst, wie bei gemeinem Rispengras und Sumpfrispengras. Die Blattspreite kann weich oder steif sein. Bei einigen Wassergräsern, z. B. *Glyceria*-Arten, enthalten die Blätter zahlreiche luftgefüllte Hohlräume (Tafel III, Abb. 2, 7, 13).

Bei mehreren Gräsern finden wir einen scharf hervortretenden Kiel längs der Mittellinie der Unterseite, und zwar besonders deutlich bei Knaulgras (Tafel IV, 1) und Rohrglanzgras, bei dem der Kiel weiß ist; weniger scharf finden wir ihn bei der echten Quecke. Viele Gräser haben auf der Oberseite der Blätter deutlich hervortretende Rippen oder Leisten, wie Rasenschmiele, bei der diese Leisten sehr hoch und mit kurzen steifen Haaren versehen sind (Tafel II, 3), weiteres bei Arten von Schwingel, Fuchschwanz usw.

Die Grasblätter sind einfach geädert, d. h. eine größere oder

kleinere Anzahl unverzweigter, parallel laufender Adern oder Nerven führt durch die gesamte Länge der Blattspreite hindurch. Der Mittelnerv ist der kräftigste. Die Nerven laufen in der Regel mitten zwischen der Hauptschicht der Oberseite und derjenigen der Unterseite hindurch. Bei der Rasenschmiele ist die obere Blattfläche durch in Reihen angeordnete, dreiseitige Leisten stark gefaltet; jede Leiste enthält gewöhnlich drei dreieckig angeordnete Adern (Tafel II, 3), von denen diejenige, welche der oberen Kante der Leiste am nächsten liegt, die kräftigste ist. Die Seitenadern in der Blattspreite können untereinander ungefähr gleich kräftig sein, wie bei Fioringras, deutschem Weidelgras, Knaulgras, Wiesenschwingel usw., oder jede zweite ist schwächer, wie bei Wiesenrispengras, welschem Weidelgras, ja bei wolligem Honiggras liegen zwei bis drei schwache Nerven zwischen je zwei kräftigen (Tafel IV, 5). Bei den meisten Gräsern finden wir weiße Bastfasern dicht an der Haut, gewöhnlich gerade vor den Nerven auf der einen oder auf beiden Seiten des Blattes. Bei Blattspreiten mit Kiel auf der Unterseite, z. B. bei Knaulgras, sind die Bastfasern besonders kräftig entwickelt (Tafel IV, 1). Der Bast kann entweder die ganze Breite des Blattes entlang den Zwischenraum zwischen den Blattnerven und der Haut auf beiden Seiten des Blattes vollkommen ausfüllen, wie bei deutschem Weidelgras (Tafel II, 11) und Knaulgras, oder die Blattnerven sind von „losem“ Gewebe umgeben und der Bast liegt nur dicht an der Haut selbst, wie bei Wiesenschwingel. Bei anderen Gräsern, z. B. weichhaariger Trespe, finden wir nur an der Unterseite der Mittelader Bastelemente entwickelt. Bei der Rasenschmiele finden wir Bastfasern auf beiden Seiten, sowohl gerade vor dem starken Nerv in jeder dreiseitigen Leiste auf der Blattfläche als zwischen den einzelnen Leisten; aus diesem Grunde scheinen bei durchfallendem Lichte weiße Streifen zwischen den Leisten die Blätter zu durchziehen (Tafel II, 3, 4). Bei borstenähnlichen Blättern liegen die Bastfasern gerade vor den Nerven an der Unterseite („Rückenseite“) und an den Blattkanten (Tafel I, 2, die dunkel gezeichneten Partien).

Seltener sind die Blätter ganz glatt, wie bei Knaulgras, Rispengras und Wiesenfuchsschwanz, gewöhnlich sind sie mehr oder weniger reich mit kurzen oder langen Haaren versehen; die kurzen sind nicht selten steif, namentlich an den Blattkanten, bisweilen

auch längs des Kieles und der Leisten, z. B. bei Rasenschmiele (Tafel II, 3). Die langen Haare können sehr spärlich sein, z. B. bei Goldhafer (Tafel IV, 4) oder sehr dicht, z. B. bei wolligem Honiggras (Tafel IV, 5). Eigentümliche, warzenähnliche Haare finden wir bei dem grauen Silbergras (Tafel II, 6).

Die Gräser haben eine lichtgrüne (gemeines Rispengras), dunkelgrüne (Rasenschmiele), blaugraue (Knaulgras) oder lichtgraue (Silbergras) Farbe in verschiedenen Nuancen. Die Farbe wechselt ein wenig nach Standort und Boden. Bei der gleichen Art kann die Farbe auf der Oberseite des Blattes recht verschieden sein von der der Unterseite. Bei Wiesenhafer, blauem Gilzgras u. a. m. ist die Oberseite des Blattes infolge eines Wachsüberzuges bläulich, die Unterseite dagegen grün, bei deutschem Weidelgras ist die Oberseite dunkler grün als die Unterseite, die glänzender ist. Im allgemeinen ist die Unterseite der Grasblätter glänzender als die Oberseite.

Der unterste Teil der Blattspreite, der Blattgrund, ist oft eigentümlich ausgebildet, gewöhnlich kurz und dünn, beim Borstengras lang, dick und steif; bald platt, wie bei Knaulgras und deutschem Weidelgras, bald mit aufwärts gebogenen Kanten, wie bei Rohrarten. Die Farbe ist oft blaß, wie bei der echten Quecke (Tafel I, 4). Bei einer Menge von Gräsern ist der Blattgrund unten zu zwei oft gezahnten Zähnen verlängert, sog. Zahnfortsätzen, die gewöhnlich spitz sind, wie bei deutschem Weidelgras, Wiesenschwingel, rauhhäariger Trespe und echter Quecke (Tafel I, 3 und 4) u. a. m., dagegen bei gemeinem Ruchgras stumpf sind (Tafel I, 5). Der Blattgrund ist mitunter stark haarig, wie bei gemeinem Ruchgras und Waldzwenke.

Eine gewisse Bedeutung für die Diagnose blütenloser Gräser besitzt auch die Anzahl und Lage der Spaltöffnungen.

Eigentümlich ist, daß bei den Gräsern die Spaltöffnungen auf der Oberseite viel zahlreicher sind als auf der Unterseite, während bei anderen Pflanzen das Umgekehrte der Fall ist. Bei einzelnen Gräsern, wie deutschem Weidelgras, Wiesenschwingel und *Poa*-Arten fehlen Spaltöffnungen auf der Unterseite überhaupt, oder es sind nur ganz wenige vorhanden (Tafel IV, 3 a, b, c). Bei Knaulgras und Timothee finden wir auf der Unterseite des Blattes zahlreiche Spaltöffnungen. Die Spaltöffnungen liegen gewöhnlich in

Reihen längs der Blattadern, auf der Oberseite jedoch unregelmäßiger verteilt als auf der Unterseite. Bemerkenswert ist, daß man weder mit freiem Auge noch mit Lupe die eigentlichen Spaltöffnungen sehen kann, die kleine, feine Löcher in der Blatthaut darstellen; dagegen liegt unter jeder Spaltöffnung ein relativ großer, luftgefüllter Hohlraum, der mit oder ohne Lupe als ein weißer Punkt erscheint.

Bei vielen Gräsern kann man, wie erwähnt, eine blaugrüne Farbe beobachten, und zwar vor allem auf der Oberseite des Blattes. Sie hat ihren Grund in einem Wachsüberzug, der sich leicht mit dem Finger entfernen läßt. Dieser Überzug tritt vielleicht am meisten bei solchen Gräsern auf, die auf trockenen Stellen wachsen, wie Wiesenhafer, blauem Gilzgras und einzelnen *Poa*-Arten.

Grasähnliche Pflanzen sind Marbel-, Simsen-, Binsen- und Riedgräserarten. Diesen fehlen gegliederte Halme und Halmknoten und ihre Stengel sind mit lockerem Mark gefüllt.

Die vegetativen Organe der Hülsenfrüchte.

Die auf Wiesen und Weiden vorkommenden Hülsenfrüchte im blütenlosen Stadium ihrer Art nach zu bestimmen, ist verhältnismäßig leicht. Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Gattungen beziehen sich zwar auch hier hauptsächlich auf die Entwicklung der Blüte und der Frucht, die großen Gruppen der Familie unterscheiden sich aber auch in der verschiedenen Form des Blattes.

Die Blätter der meisten Hülsenfrüchte sind zusammengesetzt¹, d. h. jedes Blatt besteht aus mehreren Teilblättchen, die an einem gemeinsamen Blattstiel sitzen. Man kann zwei Haupttypen unterscheiden, nämlich die paarblättrigen und die dreizähligen Blätter. Die paarblättrigen haben oft eine große Anzahl von Teilblättchen, Fiederblättchen oder nur Blättchen genannt, wie bei den Wickenarten, die sich an dem gemeinsamen Blattschaft paarweise gegenüber sitzen — einige Lathyrusarten haben jedoch

¹ Unter den schwedischen Hülsenfrüchten haben nur der in Südschweden vorkommende Heideginster (*Ulex*), der Besenginster (*Sarothamnus*) und die *Genista*-Arten einfache Blätter. Sie haben als Weidpflanzen keine Bedeutung. Die beiden ersterwähnten sind Sträucher.

einpaarige Blätter — und sie enden entweder mit einem Endblättchen oder mit sog. Ranken; mit welchen sie sich an andere Pflanzen anbinden. Selten fehlt sowohl das Endblättchen als die Ranke, wie bei einigen Platterbsenarten, wo die Ranke verkümmert ist und nur aus einer kurzen, fast fadenähnlichen Fortsetzung des Blattschaftes besteht. Bei den dreizähligen Blättern ist die Anzahl der Blättchen drei; von diesen ist das eine das Endblättchen und die beiden anderen sitzen einander gegenüber, wie bei Arten von Klee und Luzerne.

Die Form der Blättchen ist ziemlich verschieden; sie können fast rund, oval sein, mit der größten Breite in der Mitte; länglich-lanzettlich oder eirund, am breitesten an der Basis; verkehrt-eirund, am breitesten nahe der Spitze; keilförmig, von der Spitze abwärts gleichmäßig schmaler werdend. Die Blättchen desselben Blattes sind gewöhnlich ungefähr gleich groß; beim Wundklee (*Anthyllis*) ist das Endblättchen bedeutend größer als die Fiederblättchen (Tafel VI, 2). Gewöhnlich sind die Blättchen von einem kräftigen Mittelnerv durchzogen, von dem einfache oder verzweigte Nerven gegen die Ränder führen. Derartige Blätter werden fiederädig oder fiedernervig genannt (Tafel V, 2). Bei den *Lathyrus*-Arten finden wir zu beiden Seiten des Mittelnervs einige starke, bogenförmige Adern; derartige Blätter sind bogenadrig oder bogenennervig (Tafel V, 3, 4). Der Blattschaft ist mitunter platt, relativ breit und wird in diesem Falle geflügelt genannt. Von dem Ansatzpunkte des gemeinsamen Blattstieles am Stengel entspringen gewöhnlich zwei blatt- oder häutchenähnliche Gebilde, die Nebenblätter genannt werden und ein sehr verschiedenes Aussehen haben können; sie bieten daher oft gute Unterscheidungsmerkmale zwischen verwandten Arten dar. So ist beispielsweise beim Rotklee der freie Teil der Nebenblätter eirund und geht plötzlich in eine Granne über, während bei dem ähnlichen mittleren Klee der freie Teil der Nebenblätter lanzettlich ist; bei den Wickenarten sind die Nebenblätter gewöhnlich klein, pfeilförmig oder halbmondförmig, nicht selten zipfelig; bei der gewöhnlichen Wiesenplatterbse dagegen sind sie ungefähr gleich groß wie die Fiederblättchen (Tafel V, 3). Bei den *Lotus*-Arten fehlen Nebenblätter.

Der Stengel ist oft kantig, wie bei Wicken- und Platterbsenarten, ferner bei der Luzerne, bei Kleearten im allgemeinen nahezu

rund. Besonders bei mehreren Platterbsenarten ist er ebenso wie der Blattschaft geflügelt. Bei gewissen Arten kriecht er die Erdoberfläche entlang und schlägt Wurzeln, z. B. bei Weißklee und Erdbeerklee. Sowohl die Blätter als der Stengel können im übrigen glatt oder haarig sein.

Auch bei der Bestimmung von Hülsenfrüchten ist in einzelnen Fällen eine Lupe notwendig, z. B. zur Entscheidung der Äderung der Blätter oder ihrer Behaarung.

Bestimmungstabelle über Gräser im blütenlosen Zustande.

I. Blattspreiten in der Knospenlage gerollt.

Nr.

(Tafel I, 1 b₂.)

a₁ Blatthäutchen in Haare aufgelöst. (S. 6, Abb. 14.)

a₂ Blattspreite 10—40 mm breit; grobes Gras an Ufern oder auf dem Grunde einstiger Seen . .

Schilfrohr,
Phragmites
communis . .

1

b₂ Blattspreiten etwa 5 mm; Halm mit nur einem Halmknoten nahe der Basis, unter dem der Halm sehr hart ist (Tafel II, 7); auf Moorböden

Pfeifengras¹
Molinia
coerulea . .

2

b₁ Blatthäutchen von gewöhnlicher Beschaffenheit.

a₃ Halmbasis von mehreren festen, relativ großen, gelblichen Scheiden ohne Spreiten umgeben; Blattspreiten 10—20 mm breit, an den Kanten rauh, mit kräftigem Kiel

Waldschwin-
gel, *Festuca*
silvatica

3

b₃ Halmbasis ohne derartige Scheiden.

a₄ Blattspreitengrund mit Zahnfortsätzen (je eine mehr oder weniger gekrümmte Verlängerung nach beiden Seiten; (Tafel I, 3, 4, 5).

a₅ Unterseite der Blätter glänzend, glatt; Scheiden und Spreiten mit deutlichen Rippen.

a₆ Blattspreitengrund öfter mit Borstenhaaren; 20—30 Rippen.

a₇ Blätter 8—10 mm breit, Scheiden mit deutlichen Queradern, nicht langhaarig; Uferpflanze

Rohrschwin-
gel, *F. arun-*
dinacea

4

¹ Das unterste harte Halmglied erhält sich bis in das nächste Jahr, nachdem das obere Glied abgefallen ist. Da es infolge der harten vorjährigen Halmglieder unangenehm ist, über Moliniawiesen barfuß zu gehen, nennt man diese Halme in gewissen Gegenden Schwedens „Alte-Weiber-Nadeln“.

- | | Nr. |
|--|---|
| b ₇ Blätter 10—15 mm breit; Blattscheiden gewöhnlich mit langen, spärlichen Haaren; Waldpflanze | Riesen-
schwingel,
<i>F. gigantea</i> 5 |
| b ₆ Blattspreitengrund ohne Borstenhaare, Blattspreite mit 15—20 Rippen. | |
| a ₈ Blätter dunkelgrün, 3—8 mm breit, mit in der Regel schwachen Zahnfortsätzen; Blatthäutchen bräunlich, 1 mm lang; Halme an der Basis von dunkelgraubraunen, bald zu Fibern aufgeritzten Scheiden umgeben | Wiesen-
schwingel,
<i>F. elatior</i> . 6 |
| b ₈ Blätter lichtgrün oder graugrün, 3—6 mm breit, meist mit ausgezogenen Zahnfortsätzen. — Dieses Gras tritt nicht auf alten Wiesen oder Weiden auf . . . | Welsches
Weidelgras,
<i>Lolium</i>
<i>multiflorum</i> 7 |
| b ₅ Unterseite der Blätter nicht glänzend, Spreiten und namentlich Scheiden haarig, Rippen undeutlich. | |
| a ₉ Kumaringeruch, bitterer Geschmack, Zahnfortsätze stumpf, Blattgrund violett, an der Scheidenöffnung gewöhnlich langhaarig; zeitig ährentragend (Tafel I, 5) | Gemeines
Ruchgras,
<i>Anthoxan-</i>
<i>thum odora-</i>
<i>tum</i> . . . 8 |
| b ₉ Ohne Kumaringeruch, ohne bitteren Geschmack, Zahnfortsätze spitz. | |
| a ₁₀ Blatthäutchen steif, mit undeutlichen Zähnen. | |
| a ₁₁ Untere Scheiden nahezu geschlossen, mit dichten, langen Haaren. (Die Var. <i>ramosa</i> hat auch die oberen Blattscheiden langhaarig.) | Rauhhaarige
Trespe, <i>Fes-</i>
<i>tuca aspera</i> 9 |

b₁₁	Scheiden offen, Blätter gewöhnlich gedreht, so daß die Unterseite nach oben gekehrt liegt.	Nr.
a₁₂	Mit unterirdischen Ausläufern, Blattunterseite glatt, Blattgrund violett, Zahnfortsätze gewöhnlich lang, spitz (Tafel I, 4)	Quecke, <i>Triticum repens</i> 10
b₁₂	Ohne unterirdische Ausläufer, Blattunterseite rauh	Hunds- quecke, <i>T. caninum</i> 11
b₁₀	Blatthäutchen dünn und an der Spitze gezähnt.	
a₁₃	Blätter weich, 4—6 mm breit	Mäusegerste, <i>Hordeum murinum</i> . 12
b₁₃	Blätter nicht weich, 6—8 mm breit.	
a₁₄	Untere Blätter gewöhnlich glatt oder spärlich behaart . . .	Gerste, <i>Hordeum vulgare</i> und <i>distichum</i> . . 13
b₁₄	Untere Blätter kurz u. dicht behaart.	
a₁₅	Zahnfortsätze mit vorstehenden Haaren	Weizen, <i>Triticum vulgare</i> 14
b₁₅	Zahnfortsätze ohne vorstehende Haare, untere Scheiden gewöhnlich rötlich .	Roggen ¹ , <i>Secale cereale</i> 15

¹ Keimpflanzen, von denen man vermutet, daß sie zu den Getreidearten gehören, bestimmt man am sichersten durch Ausgraben des Getreidekornes. Zu beachten ist, daß sich der Hafer von allen anderen Getreidearten u. a. darin unterscheidet, daß seinen Blättern Zahnfortsätze fehlen und daß die unterste Scheide an der Roggenpflanze violett ist.

b₄ Blattspreitengrund ohne Zahnfortsätze.

Nr.


a₁₆ Wenigstens die unteren Blattscheiden behaart.

a₁₇ Alle Blattscheiden ganz geschlossen, mehr oder weniger rauh.

a₁₈ Blätter ausgebreitet; Hain- oder Waldpflanzen.

a₁₉ Blatthäutchen mit borsten-
ähnlicher Spitze (S. 6, Abb. 1, 5)

Einblütiges
Perlgras,
*Melica uni-
flora* . . . 16



Gerste



Weizen



Roggen



Hafer

Abb. 2. Blattgrund und Blatthäutchen bei den Halmblättern der 4 Getreidearten.

h Halm, sp Blattspreite, z Zahnfortsätze, s Scheide.

b₁₉ Blatthäutchen ohne borsten-
ähnliche Spitze

Nickendes
Perlgras,
M. nutans . 17

b₁₈ Blätter zusammengerollt; Kies-
bodenpflanze

Wimper-
Perlgras,
M. ciliata . 18

b₁₇ Blattscheiden wenigstens oben offen.

a₂₀ Obere Scheiden im unteren Teile
geschlossen

a₂₁ Mit kriechendem Wurzel-
stock; grob, hochwüchsig,
Blätter 5—9 mm breit . .

Grannenlose
Trespe,
*Festuca in-
ermis* . . . 19

b₂₁ Ohne kriechenden Wurzel-
stock.

a₂₂ Scheiden und Halme
behaart.

- Nr.
- a₂₃ Oberste Blattscheide
(gewöhnlich) glatt,
alle anderen mit kur-
zen, abwärts gerich-
teten Haaren . . . **Acker-
Trespe, *F.*
arvensis . . 20**
- b₂₃ Oberste Blattscheide
kurzhaarig, alle
anderen langhaarig. **Weichhaari-
ge Trespe,
F. mollis . . 21**
- b₂₂ Scheiden und Halme ge-
wöhnlich glatt, Spreiten
rauh; Ackerpflanze . . **Roggen-
Trespe, *F.*
secalina . . 22**
- b₂₀ Obere Blattscheiden ganz offen.
- a₂₄ Blätter gegen die Basis
schmäler werdend.
- a₂₅ Blätter schlaff, dünn,
mit kräftigem Kiel, dun-
kelgrün **Wald-Zwen-
ke, *Brachy-
podium sil-
vaticum* . . 23**
- b₂₅ Blätter steif, hellgrün . **Fieder-
Zwenke,
B. pinnatum 24**
- b₂₄ Blätter gegen die Basis nicht
schmäler werdend.
- a₂₆ Blattspreiten mit ver-
einzelten Haaren auf den
Nerven (Tafel IV, 4) . **Goldhafer,
*Avena fla-
vescens* . . 25**
- b₂₆ Blattspreiten kurz und
dicht behaart (Tafel IV,
5).
- a₂₇ Halme und Scheiden
behaart; Blattsprei-
ten kürzer als die
Scheiden. Unterste
Scheiden mit roten
Nerven **Wolliges
Honiggras,
*Holcus la-
natus* . . . 26**

- Nr.
- b₂₇** Halme nur an den Gelenksknoten behaart; Blattspreiten länger als die Scheiden; Wurzelstock kriechend . . **Weiches Honiggras,**
H. mollis . 27
- b₁₆** Blattscheiden glatt.
- a₂₈** Untere Scheiden geschlossen, Blattranke unten mit abwärts gerichteten Zähnen, niedrig, etwa 0,3 m hoch. **Zittergras,**
Brizamedia 28
- b₂₈** Scheiden offen; hochwüchsige Arten.
- a₂₉** Mit deutlichen Rippen auf den Blattspreiten.
- a₃₀** Blätter steif, gegen die Basis schmaler werdend (*Calamagrostis-Arten*)¹
- a₃₁** Blatthäutchen höchstens 5 mm.
- a₃₂** Blatthäutchen 2 bis 3 mm, Halm ohne Zweige.
- a₃₃** Blätter 2 bis 4 mm breit, auf der Oberseite dicht kleinborstig; Sumpfpflanze **Vernachlässigtes Schilf,**
C. neglecta 29
- b₃₃** Blätter 4 bis 7 mm breit, auf der Oberseite kurzhaarig, Waldpflanze . . **Gemeines Schilf,**
C. arundinacea . . 30

¹ Infolge des Reichtums an Varietäten und Hybriden in dieser Gattung sind die *Calamagrostis*-Arten im vegetativen Stadium unmöglich mit Sicherheit zu bestimmen. Hier wird ein Versuch mitgeteilt, in diesem Stadium einige von den häufigsten Arten zu bestimmen, die auf natürlichen Weiden verschiedener Art vorkommen können.

- Nr.
- b₃₂** Blatthäutchen 3 bis 5 mm, Halme verzweigt; Moorpflanze **Lanzettliches Schilf,**
C. lanceolata 31
- b₃₁** Blatthäutchen 5 bis 10 mm, mehr oder weniger zipfelig.
- a₃₄** Blätter etwas schlaff, Blattnerven ohne längere Haare auf der Oberseite, Halmgelenke 5—7; Waldpflanze auf mehr oder weniger verumpftem Boden. *C. purpurea* 32
- b₃₄** Blätter steif, gegen die Spitze eingerollt, graugrün, an der Kante sehr rauh, Halmgelenke 3—4; Sanderdepflanze. **Landschilf,**
C. epigejos. 33
- b₃₀** Blätter gegen die Basis nicht schmaler werdend.
- a₃₅** Blätter unten glänzend, mit deutlichem Kiel: Rohrschwingel (4), Riesenschwingel (5), Wiesenschwingel (6), welches Weidelgras (7)¹.
- b₃₅** Blätter unten nicht stark glänzend, Kiel undeutlich.
- a₃₆** Blatthäutchen steif, abgerundet oder stumpf.
- a₃₇** Völlig entwickelte Blätter mit platten, niedrigen Rippen, etwa 6—8 mm breit **Wiesenfuchsschwanz²,**
Alopecurus pratensis . 34a

¹ Bei diesen 4 Arten können die Zahnfortsätze undeutlich entwickelt sein.

² Der verwandte Rohrfuchsschwanz, 34 b, *Alopecurus ventricosus*, hat eine graugrüne Farbe.

b₃₇ Völlig entwik-
kelte Blätter mit
hohen Rippen,
Blätter etwa 3
bis 5 mm breit. Ackerfuchs-

schwanz,
A. agrestis. 35

b₃₆ Blatthäutchen dünn,
spitz oder deutlich
gezähnt, ganze
Blattoberseite rauh.

a₃₈ Rippen hoch,
scharf (Tafel II,
8), Scheiden auf-
geblasen, Blatt-
häutchen haarig

Geknickter
Fuchs-
schwanz¹,
*A. genicula-
tus* 36a

b₃₈ Rippen niedrig,
platt.

a₃₉ Blatthäut-
chen lang,
2—5 mm,
mit abge-
rundeter
Spitze;
lange Aus-
läufer .

Weißes
Straußgras
(Fioringras)
*Agrostis sto-
lonifera* . . . 37

b₃₉ Blatthäut-
chen kurz,
etwa 1 mm;
Ausläufer
fehlen . .

Rotes Strauß-
gras, *A. te-
nuis* 38

NB. Hunds-Straußgras, *Agrostis canina*, kann mit-
unter platte Blätter haben; die Blätter der
Blatttriebe sind jedoch schmal, beinahe faden-
ähnlich, etwa 1 mm dick.

¹ Der verwandte rotgelbe Fuchsschwanz, 36 b, *A. fulvus*, hat
bläuliche Scheiden.

- b₂₉** Mit undeutlichen Rippen auf den Blattspreiten (vgl. die Agrostis-Arten, die oft undeutliche Rippen haben).
- a₄₀** Querverbindungen zwischen den Adern in den Scheiden bei durchfallendem Lichte sichtbar.
- a₄₁** Niedrig, mit Kumarin-geruch, Halme weich, Gelenke von den Scheiden verborgen **Wohl-
riechendes
Mariengras,
Hierochloa
odorata . . 39**
- b₄₁** Hochwüchsig, geruchlos, Halme steif, grob, Blätter mit weißem Blattkiel, Blatthäutchen milchweiß; an Ufern häufig (Tafel II, 10) **Rohrglanz-
gras,
Phalaris
arundinacea 40**
- b₄₀** Querverbindungen zwischen den Nerven in den Scheiden fehlen.
- a₄₂** Blatthäutchen auf der Rückenseite glatt.
- a₄₃** Blätter gegen die Basis deutlich schmaler werdend; deutlicher Blattkiel, Blatthäutchen lang, 5—7 mm, zer-
teilt **Fluttergras,
Miliium
effusum 41**
- b₄₃** Blätter gegen die Basis nicht schmaler werdend.
- a₄₄** Halmbasis zwie-
belförmig, Schei-
den nicht auf-
geblasen, Blät-
ter rein grün,

- Nr.
- Blatthäutchen
milchweiß,
durchsichtig,
feingezähnt, 3
bis 5 mm; die
Scheidenkan-
ten finden oben
oft ihre Verlän-
gerung in einem
von dem eigent-
lichen Blatt-
häutchen mehr
oder weniger
deutlich ge-
trennten Zahn
auf jeder Seite
der Blattgrund
(Lupe!) **Timothee,**
Phleum
pratense . 42
- b₄₄** Halmbasis nicht
zwiebförmig,
obere Scheiden
etwas erweitert,
Blätter grau-
grün, Blatt-
häutchen quer
abgeschnitten,
2—3 mm . . . **Glanz-**
lieschgras,
Phl. Boeh-
meri . . . 43
- b₄₂** Blatthäutchen auf der
Rückenseite feinhaarig.
- a₄₅** Blätter kräftig, obe-
re Blätter 12 bis
20 mm breit . . . **gew. Hafer¹,**
Avena
sativa . . 44
- b₄₅** Blätter mittelkräf-
tig, obere Blätter 6
bis 12 mm breit,
gelbgrün (S. 6, Ab-
bild. 1, 3) **Glatthafer**
A. elatior . 45

¹ Über Keimpflanzen der Getreidearten s. Fußnote S. 16.

II. Blattspreiten mit in der Knospenlage gefalteten Blatthälften oder mit borstenähnlichen, gefurchten „Wurzelblättern“.

- a₁ Blatthäutchen in lange Wollhaare aufgelöst, Scheiden und Spreiten langhaarig, blaugrün . **Dreizahn,**
Sieglingia
decumbens . 46 Nr.
- b₁ Blatthäutchen von gewöhnlicher Beschaffenheit.
- a₂ Blätter ohne Rippen auf der Oberseite.
- a₃ Blätter in entwickeltem Zustande platt.
- a₄ Sämtliche Blattscheiden ganz geschlossen, wenigstens im ersten Stadium.
- a₅ Blätter allmählich zugespitzt, Blattkanten rauh, deutlicher Blattkiel.
- a₆ Blätter 5—8 mm breit, lang, mit tiefer Furche über dem Mittelnerv, Triebe platt, 2—7 mm breit (Tafel IV) **Knaulgras,**
Dactylis
glomerata . 47
- b₆ Blätter 1,5—3 mm breit, bläulich; untere Blätter zahlreich, 5—12 cm, wenige Halmblätter, 1—2 cm lang; niedrig; zeitige Blüte **Blaues Gilzgras, Sesleria coerulea** 48
- b₅ Blätter mit stumpfer Spitze (Tafel III, 6).
- a₇ Blätter mit zahlreichen Luftgängen (sichtbar mit guter Lupe bei Querschnitt durch das Blatt).
- a₈ Blätter 10—25 mm breit; Scheiden oben mit 2 gelbbraunen Flecken, Quernerven in den Blattscheiden und Blattspreiten, Blatthäutchen 2—3 mm, hohes Wassergras (Tafel III) **Wasserschwaden¹,**
Glyceria
aquatica . . 49a
- b₈ Blätter 4—5 mm breit, ohne Quernerven; niedriges Wassergras mit stark verzweigtem

¹ Schwingelschilf, 49b, *Scolochloa festucacea*, ähnelt dem Wasserschwaden, mit welchem es oft zusammen auftritt. Es hat aber längere Blatthäutchen und die gelbbraunen Blattscheideflecken mangeln.

- Wurzelstock und knieförmig gebogenem Halm (Tafel III, 13). **Wasser-
Quellgras,
Catabrosa
aquatica . . 50**
- b₇** Blätter ohne Luftgänge, keine oder nur wenige Quernerven.
- a₉** Scheiden im ersten Stadium bis zur Spreite geschlossen, weichhaarig, Spreite rein grün und weich.
- a₁₀** Blattspreiten 8—10 cm lang, 5—8 mm breit, rein grün, Blatthäutchen 4 bis 6 mm, spitz, Scheiden glatt, weichhaarig . . . **Weichhaariger Hafer,
Avena
pubescens . 51**
- b₁₀** Blattspreiten 15—20 cm lang, langspitz, 3—5 mm breit, hellgrün, Blatthäutchen kurz, quer abgeschnitten **Aufrechte
Trespe,
Festuca
erecta . . 52**
- b₉** Scheiden zeitig offen, rauh, Blätter mit bläulicher Oberseite, deutlicher Blattkiel (Tafel II, 9) **Wiesen-Hafer, Avena
pratensis . 53**
- b₄** Scheiden ganz oder teilweise offen.
- a₁₁** Blatttriebe von grauweißen Scheiden umgeben, die zu einem zwiebel förmigen Gebilde angehäuftsind, wenige kurze Stengelblätter, 3 bis 5 cm, stumpf, mit schräger Spitze, blaugrün, mit langem Blatthäutchen **Alpenrispengras, Poa
alpina . . 54**
- b₁₁** Ohne weiße Scheiden auf den Blatttrieben, Blätter ohne schräge Spitze.

a₁₂ Blatthäutchen kurz, quer abgeschnitten.

a₁₃ Lichte Streifen längs des Mittelnervs die ganze Blattscheibe entlang.

a₁₄ Ohne unterirdische Ausläufer. Hochwüchsiges Gras. Blätter 8 bis 10 mm breit, das oberste 10—20 cm lang, Scheiden rau

Schlaffes
Rispen-
gras¹, *Poa*
remota. . . 55a

b₁₄ Mit unterirdischen Ausläufern.

a₁₅ Blatthäutchen ungefähr so lang wie der Blattgrund, zart, etwas abgerundet. Halm unten knieförmig gebogen, die Blattknoten zusammengedrückt, Halmblätter spärlich, 2—3 mm breit, Scheiden länger als die Spreiten

Zusammen-
gedrücktes
Rispengras,
P. compressa 56

b₁₅ Blatthäutchen sehr kurz, oft kaum bemerkbar. Blattspreite linealisch, die Spitze breit und kapuzenförmig zusammengezogen.

a₁₆ Ausläufer mit zahlreichen, kurzen, rohrförmigen, niedri-

¹ Schlaffes Rispengras hat die Scheide mitunter ganz geschlossen. Var. Waldrispengras, *Poa chaixii*, 55 b, hat etwas breitere Blätter, an der Spitze haubenähnlich zusammengezogen, das oberste etwa 5, höchstens 10 cm lang,

- | | | |
|-----------------|--|--|
| | gen Blättchen,
obere Blatt-
fläche bläulich | Nr. |
| | | <i>P. humilis</i> ¹ 57 |
| b ₁₆ | Ausläufer ohne
derartige nied-
rige Blättchen,
obere Blatt-
fläche grün . . | Wiesen-
rispengras ² ,
<i>P. pratensis</i> 58 |
| b ₁₃ | Lichte Streifen längs des
Mittelnervs nur in der
Nähe der Blattspitze.
Scheiden kürzer als die
Zwischenglieder des Halmes | Hainrispen-
gras, P.
<i>nemoralis</i> . 59 |
| b ₁₂ | Blatthäutchen lang, zugespitzt
oder abgerundet. | |
| a ₁₇ | Lichte Streifen längs des
Mittelnervs die ganze Blatt-
scheibe entlang. | |
| a ₁₈ | Mit oberirdischen Aus-
läufern, Scheiden rauh.
Blattspreiten unterseits
stark glänzend. Blatt-
häutchen zugespitzt . . | Gemeines
Rispengras,
<i>P. trivialis</i> 60 |
| b ₁₈ | Ohne Ausläufer. Blätter
nicht besonders glän-
zend, hellgrün. Blatt-
häutchen kragenförmig,
abgerundet. Halm un-
terhalb der Mitte be-
blättert, einjährig, aber
überwinternd | Jähriges
Rispengras,
<i>P. annua</i> . 61 |
| b ₁₇ | Lichte Streifen längs des
Mittelnervs nur in der Nähe | |

¹ Diese Art dürfte der von Professor LINDMAN aufgestellten Art *Poa irrigata* entsprechen, die er Moorrispengras nennt.

² Eine Varietät mit nahezu fadenschmalen Blättern auf magerer ist *Poa angustifolia*.

- der Blattspitze. Die Scheiden bedecken die Zwischenglieder des Halmes **Sumpfrispengras,**
P. palustris 62
- b₃** Wenigstens die Wurzelblätter im entwickelten Zustande borstenähnlich oder fadenschmal, mit einer mehr oder weniger tiefen Furche auf der Oberseite (Lupe!).
- a₁₉** Blätter solid, mit undeutlicher Furche, überall gleich dick, Querschnitt rundlich-herzförmig, 5—6kantig (Tafel II, 1) **Geschlängelte Schmieie,**
Aira flexuosa . 63
- b₁₉** Blätter mit deutlicher Furche, Querschnitt durch das Blatt oval.
- a₂₀** Blatthäutchen sehr kurz.
- a₂₁** Blattspreite im Querschnitt mit 5 stärkeren und 2 feineren Nerven (Tafel I, 2b); Stengelblätter platt **Rotschwingel, Festuca rubra** . . . 64
- b₂₁** Blattspreite im Querschnitt mit 3 kräftigeren und 4 feineren Nerven (Tafel I, 2a), Blätter haarfein, etwa 0,5 mm im Durchmesser **Schafschwingel¹,**
F. ovina . . 65
- b₂₀** Blatthäutchen ausgezogen, spitz; Blätter
- a₂₂** mit spitzen, aufrechten Warzen; graugrün, mit Horst (Tafel II, 6) **Silbergras,**
Corynephorus canescens 66
- b₂₂** ohne aufwärts gerichtete Warzen.

¹ Borstenschwingel, *F. duriuscula*, ist eine dunkelgrüne Var. mit etwa 1 mm dicken Blättern. Die Abart *F. polesica* hat pergamentartige, gelbliche Basalscheiden.

- Nr.
- a₂₃** Mit dichtem Horst, mit
gespreizten, steifen,
rauen Blättern und wei-
ßer, auf der Innenseite
gefurchter, geschwollener
Blattgrund (Tafel I, 2c) **Steifes**
Borstengras,
Nardus
stricta . . 67
- b₂₃** Mit dünnem Horst, zart,
Stengelblätter platt oder
gefaltet, etwa 2 mm, Ba-
salblätter fast fadenähn-
lich, etwa 1 mm dick . **Hundstrauß-**
gras, *Agro-*
stis canina 68
- b₂** Blätter mit deutlichen Rippen auf der Ober-
seite.
- a₂₄** Mit Quernerven in Scheiden und Spreiten
sowie großen Luftgängen (Tafel III, 7, 9,
10) **Mannagras**¹,
Glyceria
fluitans . . 69a
- b₂₄** Ohne Quernerven und Luftgänge.
- a₂₅** In durchfallendem Lichte sind weiße
oder hellgrüne, längsgerichtete Li-
nien zwischen den Rippen zu sehen.
- a₂₆** Rippen hoch, scharf, mit kurzen,
rauen Haaren (Tafel II, 3, 4, 5). **Rasen-**
schmiele²,
Aira
caespitosa . 70a
- b₂₆** Rippen niedrig, platt, wenig
rauh, Blätter an der Spitze hau-
benähnlich zusammengezogen
(Tafel III, 11, 12) **Salzschwa-**
den, *Glyce-*
ria distans 71
- b₂₅** Ohne weiße, längsgerichtete Linien
zwischen den Rippen.
- a₂₇** Rippen der Blattspreite von ver-
schiedener Form, teils platt, teils

¹ Faltiger Schwaden, 69 b, *Glyceria plicata*, ist im blütenlosen
Zustande nicht von Mannagras zu unterscheiden.

² Ostseeschmiele, 70 b, *Aira bottnica*, hat wenig rauhe Blätter.
Uferpflanze.

gekielt; Blätter blaugrau, kurzhaarig (Tafel II, 2) Nr.
Meergrünes Schillergras, *Koeleria glauca* 72

b₂₇ Rippen der Blattspreite gleichförmig, Blätter grün.

a₂₈ Blattspreiten steif und derb. Die jüngsten Blätter borstenförmig oder borstenartig eingerollt.

Rotschwingelformen (Siehe Nr. 64).

b₂₈ Die Blattspreiten weich und dünn.

a₂₉ Untere Blattscheiden mehr oder weniger violett, Blätter gewöhnlich 3—6 mm breit, oft zu sichelförmig gekrümmten Zahnfortsätzen ausgezogen, Blatthäutchen 1 mm lang; zu beiden Seiten des Mittelnervs des Blattes eine tiefe Furche, die sich bis zur Blattspitze erstreckt. Bastzellen erfüllen den ganzen Zwischenraum zwischen jedem Blattnerv und der Haut sowohl auf der Ober- als auf der Unterseite des Blattes. NB. Bei Betrachtung von Querschnitten ist eine Lupe zu verwenden (Tafel II, 11)

Deutsches Weidelgras, *Lolium perenne*. . 73

b₂₉ Untere Blattscheiden blaßgelb, Blätter 1—3 mm breit, gewöhnlich ohne Zahnfortsätzen, Blatthäutchen kaum 1 mm; die Blattadern sind vollkommen von grünem Gewebe umschlossen; die Bastzellen liegen dicht an der Haut zu bei-

den Seiten der Blattadern.
NB. Zur Betrachtung von
Querschnitten Lupe erforder-
lich

Nr.

Kammgras,
Cynosurus
cristatus . . 74

Bestimmungstabelle für Hülsenfrüchte im blütenlosen Zustande.

I. Blätter paarig.

Nr.

a₁ Ohne Endblättchen (Tafel V).

a₂ Mit langen, verzweigten Ranken.

a₃ Blättchen federnervig (Lupe!). Siehe Fuß-
note 2.

a₄ Blätter 2—5 paarig.

a₅ Blättchen 10—15 mm lang.

a₆ Blättchen umgekehrt eiförmig,
quer abgeschnitten, ausgekerbt,
mit Stachelspitze, etwa 5 mm
breit, die oberen lanzettähnlich

**Schmalblätt-
rige Wicke¹**
*Vicia an-
gustifolia* . 75

b₆ Blättchen nahezu gleichbreit,
nicht quer abgeschnitten, etwa
3 mm breit

**Viersamige
Wicke, V.**
tetrasperma 76

b₅ Blättchen etwa 3 mm lang und
2 mm breit, eirund, mit behaarten
Kanten

Heckenwicke
*V. dumeto-
rum* . . . 77

b₄ Blätter 4—12 paarig.

a₇ Blätter 8—12 paarig, mit länglichen,
spitzen Blättchen.

a₈ Stengel wenig verzweigt, schlaff.

a₉ Stengel lang wollhaarig . . **Zottelwicke,**
V. villosa . 78

b₉ Stengel fein behaart (Tafel
V, 1).

Vogelwicke²,
V. cracca . 79

¹ Var. *Bobartii* hat 1—2 paarige untere Blätter.

² Eine seltene schmalblättrige Varietät, *Vicia tenuifolia*, der
Vogelwicke mit bis zu 15 paarigen Blättern hat verdicht bogenner-
vige Blättchen.

- b₈ Stengel stark verzweigt, steif **Kassubische Nr.**
Wicke, V.
cassubica . 80
- b₇ Blätter 4—8 paarig, mit an der Spitze
quer abgeschnittenen Blättchen.
a₁₀ Blättchen nahezu gleichbreit,
15—20 mm lang, 3—5 mm breit;
mit Stachelspitze **Zitterlinse,**
V. hirsuta . 81
- b₁₀ Blättchen eirund oder ver-
kehrt eirund.
a₁₁ Blättchen eirund ohne
Stachelspitze.
a₁₂ Nebenblätter nahezu
pfeilähnlich, gezahnt,
Blättchen haarig
(Lupe!) **Zaunwicke,**
V. sepium . 82
- b₁₂ Nebenblätter halb-
mondförmig, zipfelig,
Blättchen glatt . . . **Waldwicke,**
V. silvatica 83
- b₁₁ Blättchen verkehrt-eiför-
mig, ausgerandet mit
Stachelspitze **Futterwicke,**
V. sativa . 84
- b₃ Blättchen bogennergig (Tafel V, 3), Blät-
ter 1—3 paarig.
a₁₃ Nebenblätter ungefähr gleichgroß wie
die Blättchen **Wiesenplatt-**
erbse, La-
thyrus pra-
tensis . . 85
- b₁₃ Nebenblätter kleiner als die Blättchen.
a₁₄ Blätter 2—3 paarig, Blattstiel
nicht geflügelt (Tafel V, 4) . . . **Sumpfplatt-**
erbse, L. pa-
lustris . . 86
- b₁₄ Blätter 1 paarig, Blattstiel geflü-
gelt; Blättchen 1—2 dm lang **Waldplatt-**
erbse, L. sil-
vestris¹ . . 87
- b₂ Mit kurzer, fadenähnlicher Spitze über dem
obersten Blättchen oder mit kurzer, unver-
zweigter Ranke.

¹ Die Abart Verschiedenblättrige Platterbse, *L. heterophyllus*, hat
2 paarige obere Blätter.

- a₁₅** Stengel geflügelt **Bergplatt-** Nr.
erbse, *Oro-*
bustuberosus 88
- b₁₅** Stengel nicht geflügelt.
- a₁₆** Blätter 4—7paarig, Blättchen etwa
1 cm breit **Schwarze**
Platterbse
O. niger . . 89
- b₁₆** Blätter 2—4paarig.
- a₁₇** Stengel glatt, unverzweigt, auf-
recht, Blättchen 2—3 cm breit,
zeitige Blüte **Frühlings-**
platterbse,
O. vernus . 90
- b₁₇** Stengel behaart, an der Basis
stark verzweigt, liegend, Blätt-
chen 6—12 mm breit **Kleine**
Wicke, Vi-
cia lathy-
roides . . 91
- b₁** Mit Endblättchen (Tafel VI).
- a₁₈** Glattes, grobes Kraut mit etwa 4 cm langen
Kleinblättern, 2 cm langen Nebenblättern,
3—7paarigen Blättern **Bärenschole,**
Astragalus
glycyphyllus 92
- b₁₈** Haarige Kräuter
- a₁₉** Mit 6—12paarigen Blättern.
- a₂₀** Stengel aufrecht.
- a₂₁** Stengel mit Blättern, Neben-
blätter krautartig **Behaarte**
Fahnen-
wicke, Oxy-
tropis pilosa 93
- b₂₁** Stengel blattlos, Nebenblätter
häutchenartig *O. campestris* 94
- b₂₀** Stengel liegend, mit etwa 5 mm
langen Blättchen (Tafel VI, 1) . . **Mäusewicke¹**
Ornithopus
perpusillus 95a
- b₁₉** Blätter geringpaarig.
- a₂₂** Endblättchen größer als die Fieder-
blättchen (Tafel VI, 2). **Wundklee,**
Anthyllis
vulneraria 96

¹ Die verwandte, zu Gründüngung geeignete, kultivierte *Serradella*, 95 b, *Ornithopus sativus*, ist gröber und hat 12—18 paarige Blätter.

b₂₂	Endblättchen nicht größer als die Fiederblättchen.	Nr.
a₂₃	Wurzelstock ohne Ausläufer, Stengel markig	Gemeiner Hornklee ¹ , <i>Lotus corniculatus</i> . . 97a
b₂₃	Wurzelstock mit Ausläufern, Stengel hohl	Sumpfhorn- klee, <i>L. uliginosus</i> . . 98
II. Blätter 3zählig² (Tafel VII).		
a₁	Stengel mit Dornen.	
a₂	Stengel ein- oder zweireihig behaart, Wurzelstock ohne Ausläufer	Dornige Hauhechel, <i>Ononis spinosa</i> . . . 99
b₂	Stengel ringsum behaart, Wurzelstock mit Ausläufern	Kriechende Hauhechel, <i>O. repens</i> . . 100
b₁	Stengel ohne Dornen.	
a₃	Wohlriechend, hochwüchsig, Blättchen dicht stachelspitzig gesägt, etwa 4 cm lang, Nebenblätter zipfelig gezähnt	Gezählter Steinklee ³ , <i>Melilotus dentatus</i> . . 101a
b₃	Nicht wohlriechend.	
a₄	Klebrig behaart, übelriechend	Bockshau- hechel, <i>Ononis arvensis</i> . . 102

¹ Der in Schweden vorkommende, seltene *Lotus tenuifolius*, 97 b, unterscheidet sich durch schmale, lanzettförmige Fliederblättchen.

² Die Blätter der *Lotus*-Arten erinnern an 3zählige Blätter; sie haben keine Nebenblätter.

³ Andere, gleichfalls wohlriechende *Melilotus*-Arten, die ganzrandige Nebenblätter haben, kommen hauptsächlich auf Schiffslastplätzen vor. Der weiße Steinklee, 101 b, *Melilotus albus*, der sich mit magerer Erde begnügt und gegen Dürre sehr widerstandsfähig ist, hat in der letzten Zeit in einzelnen Gebieten der Vereinigten Staaten große Bedeutung erlangt. Als Grünfutter infolge Gehalts an Kumaringift ungeeignet.

- b₄ Nicht klebrig behaarte, geruchlose Kräuter. Nr.
- a₅ Blättchen mehr oder weniger länglichkeilig (Tafel VII, 4).
- a₆ Endblättchen gestielt.
- a₇ Stengel kantig, Blättchen 1,5 bis 2 cm lang Schnecken-
klee (Lu-
zerne), *Me-
dicago sa-
tiva* . . . 103
- b₇ Stengel nahezu rund, Blättchen etwa 1 cm Sichelklee,
M. falcata . 104
- b₆ Endblättchen ungestielt; dicht behaartes Kraut Hasenklee,
*Trifolium
arvense* . . 105
- b₅ Blättchen lanzettlich oder abgerundet.
- a₈ Blättchen wenigstens an den Kanten behaart.
- a₉ Blättchen lanzettlich (Tafel VII, 2).
- a₁₀ Blättchen mit verdickten Nerven, an den Rändern scharf klein gesägt Weißer Berg-
klee, *T. mon-
tanum* . . 106
- b₁₀ Blättchen ohne verdickte Nerven, an den Rändern meist sehr fein, nicht aber scharf gezähnt Mittlerer
Klee, *T.
medium* . . 107
- b₉ Blättchen oval oder eirund.
- a₁₀ Alle Blättchen nahezu ungestielt.
- a₁₂ Seitennerven der Blättchen verzweigt, Nebenblätter häutchenartig, Blättchen mit gewöhnlich winkelförmigem, weißem Fleck (Tafel VII, 1) Rotklee¹,
T. pratense 108

¹ Europäischer Rotklee hat einen zusammengedrückten haarigen, amerikanischer einen gespreizten behaarten Stengel.

- Nr.
- b₁₂** Seitennerven der Blättchen einfach, Nebenblätter krautartig, weiß gewimpert **Brauner Klee, T. *spadiceum* . 109**
- b₁₁** Endblättchen gestielt, Stengel gewöhnlich liegend (Tafel VI, 4) **Gemeiner Schneckenklee (Gelbklee), *Medicago lupulina* . . . 110**
- b₈** Blättchen fast glatt oder nur auf dem Mittelnerv behaart.
- a₁₃** Stengel wurzelschlagend, liegend.
- a₁₄** Blättchen unten ganz glatt, glänzend, auf der Oberseite mit bogenförmigem weißem Fleck (Tafel VII, 3) . . . **Weißklee, *Trifolium repens* . . 111**
- b₁₄** Blättchen auf dem Mittelnerv auf der Unterseite behaart. **Erdbeerklee, T. *fragiferum* . . . 112**
- b₁₃** Stengel aufrecht.
- a₁₅** Seitennerven der Blättchen verzweigt **Schwedischer Klee, T. *hybridum* 113**
- b₁₅** Seitennerven der Blättchen nahezu einfach.
- a₁₆** Endblättchen deutlich gestielt, Nebenblätter eirund **Liegender Klee, T. *procumbens* 114**
- b₁₆** Endblättchen beinahe ungestielt, Nebenblätter lanzettlich **Goldklee, T. *agrarium* . 115**

Verzeichnis der deutschen Namen.

(Die Ziffern beziehen sich auf die Nummern.)

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Ackerfuchsschwanz 35. | Hasenklee 105. |
| Acker-Trespe 20. | Heckenwicke 77. |
| Alpenrispengras 54. | Hundsquecke 11. |
| Aufrechte Trespe 52. | Hundstraußgras 38 NB. und 68. |
| Bärenschole 92. | Jähriges Rispengras 61. |
| Behaarte Fahnenwicke 93. | Kammgras 74. |
| Bergplatterbse 88. | Kassubische Wicke 80. |
| Blaues Gilzgras 48. | Kleine Wicke 91. |
| Bockshauhechel 102. | Knaulgras 47. |
| Borstenschwingel 65. Fußn. | Kriechende Hauhechel 100. |
| Brauner Klee 109. | Landschilf 33. |
| Deutsches Weidelgras 73. | Lanzettliches Schilf 31. |
| Dornige Hauhechel 99. | Liegender Klee 114. |
| Dreizahn 46. | Luzerne 103. |
| Einblütiges Perlgras 16. | Mannagras 69a. |
| Erdbeerklee 112. | Mäusegerste 12. |
| Faltiger Schwaden 69b. | Mäusewicke 95. |
| Fiederzwenke 24. | Meergrünes Schillergras 72. |
| Fioringras 37. | Mittlerer Klee 107. |
| Flattergras 41. | Nickendes Perlgras 17. |
| Frühlingsplatterbse 90. | Ostseeschmiele 70b. |
| Futterwicke 84. | Pfeifengras 2. |
| Geknieter Fuchsschwanz 36a. | Quecke 10. |
| Gelbklee 110. | Rasenschmiele 70a. |
| Gemeiner Hafer 44. | Rauhaarige Trespe 9. |
| Gemeiner Hornklee 97a. | Riesenschwingel 5. |
| Gemeines Rispengras 60. | Roggen 15. |
| Gemeines Ruchgras 8. | Roggentrespe 22. |
| Gemeines Schilf 30. | Rohrfuchsschwanz 34b. |
| Gemeiner Schneckenklee 110. | Rohrglanzgras 40. |
| Gerste 13. | Rohrschwingel 4. |
| Geschlängelte Schmiele 63. | Rotes Straußgras 38. |
| Gezählter Steinklee 101a. | Rotgelber Fuchsschwanz 36b. |
| Glanzlieschgras 43. | Rotklee 108. |
| Glatthafer 45. | Rotschwingel 64. |
| Goldhafer 25. | Salzschwaden 71. |
| Goldklee 115. | Schafschwingel 65. |
| Grannenlose Trespe 19. | Schilfrohr 1. |
| Hainrispengras 59. | Schlaffes Rispengras 55a. |

- Schmalblättrige Wicke 75.
Schneckenklee 103.
Schwarze Platterbse 89.
Schwedischer Klee 113.
Schwingelschilf 49b.
Serradella 95b.
Sichelklee 104.
Silbergras 66.
Steifes Borstengras 67.
Sumpfhornklee 98.
Sumpfplatterbse 88.
Sumpfrispengras 62.
Timothee 42.
Vernachlässigtes Schilf 29.
Verschiedenblättrige Platterbse
87. Fußn.
Viersamige Wicke 76.
Vogelwicke 79.
Waldplatterbse 87.
Waldrispengras 55b.
Waldschwingel 3.
Waldwicke 83.
Waldzwenke 23.
Wasserquellgras 50.
Wasserschwaden 49a.
- Weiches Honiggras 27.
Weichhaariger Hafer 51.
Weichhaarige Trespel 21.
Weißer Bergklee 106.
Weißer Steinklee 101b.
Weißes Straußgras 37.
Weißklee 111.
Weizen 14.
Welsches Weidelgras 7.
Wiesenfuchsschwanz 34a.
Wiesenhafer 53.
Wiesenplatterbse 85.
Wiesenrispengras 58.
Wiesenschwingel 6.
Wimperperlgras 18.
Wohlriechendes Mariengras 39.
Wolliges Honiggras 26.
Wundklee 96.
Zaunwicke 82.
Zittergras 28.
Zitterlinse 81.
Zottelwicke 78.
Zusammengedrücktes Rispen-
gras 56.


Verzeichnis der lateinischen Namen.

(Die Ziffern beziehen sich auf die Nummern.)


- | | |
|---|--|
| <p><i>Agrostis canina</i> 38 NB. und 68.
 — <i>stolonifera</i> (syn. <i>alba</i>) 37.
 — <i>tenuis</i> (syn. <i>vulgaris</i>) 38.
 <i>Aira caespitosa</i> 70a.
 — <i>bottnica</i> 70b.
 — <i>flexuosa</i> 63.
 <i>Alopecurus agrestis</i> 35.
 — <i>geniculatus</i> 36a.
 — <i>fulvus</i> 36b.
 — <i>pratensis</i> 34a.
 — <i>ventricosus</i> 34b.
 <i>Anthoxanthum odoratum</i> 8.
 <i>Anthyllis vulneraria</i> 96.
 <i>Astragalus glycyphyllos</i> 92.
 <i>Avena elatior</i> 45.
 — <i>flavescens</i> 25.
 — <i>pratensis</i> 53.
 — <i>pubescens</i> 51.
 — <i>sativa</i> 44.
 <i>Baldingera: Phalaris</i> 40.
 <i>Brachypodium pinnatum</i> 24.
 — <i>silvaticum</i> 23.
 <i>Briza media</i> 28.
 <i>Bromus: Festuca</i> 9, 19, 20, 21, 22, 52.
 <i>Calamagrostis arundinacea</i> 30.
 — <i>epigeios</i> 33.
 — <i>lanceolata</i> 31.
 — <i>neglecta</i> (syn. <i>stricta</i>) 29.
 — <i>purpurea</i> 32.
 <i>Catabrosa aquatica</i> 50.
 <i>Corynephorus canescens</i> 66.
 <i>Cynosurus cristatus</i> 74.
 <i>Dactylis glomerata</i> 47.
 <i>Festuca arundinacea</i> 4.
 — <i>arvensis</i> 20.
 — <i>aspera</i> 9.
 — <i>duriuscula</i> 65. Fußnote.
 — <i>elatior</i> 6.</p> | <p><i>Festuca erecta</i> 52.
 — <i>gigantea</i> 5.
 — <i>inermis</i> 19.
 — <i>mollis</i> 21.
 — <i>ovina</i> 65.
 — <i>polesica</i> 65. Fußnote.
 — <i>rubra</i> 64.
 — <i>secalina</i> 22.
 — <i>silvatica</i> 3.
 <i>Glyceria aquatica</i> 49a.
 — <i>distans</i> 71.
 — <i>fluitans</i> 69a.
 — <i>plicata</i> 69b.
 <i>Hierochloa odorata</i> 39.
 <i>Holcus lanatus</i> 26.
 — <i>mollis</i> 27.
 <i>Hordeum distichum</i> 13.
 — <i>murinum</i> 12.
 — <i>vulgare</i> 13.
 <i>Koeleria glauca</i> 72.
 <i>Lathyrus heterophyllus</i> 87. Fußnote.
 — <i>palustris</i> 86.
 — <i>pratensis</i> 85.
 — <i>silvestris</i> 87.
 <i>Lolium perenne</i> 73.
 — <i>multiflorum</i> 7.
 <i>Lotus corniculatus</i> 97a.
 — <i>tenuifolius</i> 97b.
 — <i>uliginosus</i> 98.
 <i>Medicago falcata</i> 104.
 — <i>lupulina</i> 110.
 — <i>sativa</i> 103.
 <i>Melica ciliata</i> 18.
 — <i>nutans</i> 17.
 — <i>uniflora</i> 16.
 <i>Melilotus albus</i> 101b.
 — <i>dentatus</i> 101a.
 <i>Milium effusum</i> 41.</p> |
|---|--|

Molinia coerulea 2.
Nardus stricta 67.
Ononis arvensis 102.
 — *repens* 100.
Ononis spinosa 99.
Ornithopus perpusillus 95a.
 — *sativus* 95b.
Orobis niger 89.
 — *tuberosus* 88.
 — *vernus* 90.
Oxytropis campestris 94.
Oxytropis pilosa 93.
Phalaris arundinacea 40.
Phleum Boehmeri 43.
 — *pratense* 42.
Phragmites communis 1.
Poa alpina 54.
 — *angustifolia* 58. Fußnote.
 — *annua* 61.
 — *chaixii* 55b.
 — *compressa* 56.
 — *humilis* (syn. *irrigata*) 57. Fußnote.
 — *nemoralis* 59.
 — *palustris* (syn. *serotina*) 62.
 — *pratensis* 58.
 — *remota* (syn. *hybrida*; *sudetica*) 55a.
 — *trivialis* 60.
Scolochloa festucacea 49b. Se not.
Secale cereale 15.


Sesleria coerulea 48.
Sieglingia decumbens 46.
Trifolium agrarium 115.
 — *arvense* 105.
 — *fragiferum* 112.
 — *hybridum* 113.
 — *medium* 107.
 — *montanum* 106.
 — *pratense* 108.
 — *procumbens* 114.
 — *repens* 111.
 — *spadiceum* 109.
Trisetum: Avena 25.
Triticum caninum 11.
 — *repens* 10.
 — *vulgare* 14.
Vicia angustifolia 75.
 — — Var. *Bobartii* 75. Fußnote.
 — *cassubica* 80.
 — *cracca* 79.
 — *dumetorum* 77.
 — *hirsuta* 81.
 — *lathyroides* 91.
 — *sativa* 84.
 — *sepium* 82.
 — *silvatica* 83.
 — *tenuifolia*. 79. Fußnote.
 — *tetrasperma* 76.
 — *villosa* 78.
Weingaertneria: Corynephorus 66.




I




2



3




4




5


1a₁. Teil des Halmes, der Scheide und des Blattes mit gefalteter Spreite, a₂ Querschnitt durch das Blatt in der Knospenlage. 1b₁. Teil des Halmes und Blattes mit offener Scheide, b₂ Querschnitt durch das Blatt in der Knospenlage, die eingerollt ist. 2. Querschnitt durch ein fadenschmales Blatt von Schafschwingel (a), von Rotschwingel (b) und von Borstengras (c). 3. Blatt- und Scheidepartie von rauhhäariger Trespe: a unterer Teil der Spreite, b Teil der Scheide, c Blattgrund, d Blatthäutchen, e Zahnfortsätze. 4. Blatt- und Scheideteil von Quecke, der den Blattgrund und die gekrümmten Zahnfortsätze zeigt. 5. Blatt- und Scheidepartie von Ruchgras: a in natürlicher Größe, b vergrößert, die stumpfen Blattohrchen zeigend.



1a und b. Querschnitt durch ein Blatt von geschlängelter Schmielesch. 2. Querschnitt durch ein Blatt von meergrünem Schillergras. 3. Blatteil von Rasenschmielesch mit gekielten, steifhaarigen Rippen. 4. Blatteil von Rasenschmielesch mit weißen Linien zwischen den Rippen. 5. Scheide- und Blatteil von Rasenschmielesch mit dünnem, spitzem Blatthäutchen. 6. Stengelteil von Silbergras mit ausgezogenem Blatthäutchen. 7. Pfeifengras mit noch erhaltenen Gliedern vom vorhergehenden Jahre. 8. Querschnitt durch ein Blatt von geknicktem Fuchsschwanz. 9. Querschnitt durch ein Blatt von Wiesenhafer. 10. Teil der Blattscheide von Rohrglanzgras mit Querzweigen zwischen den Nerven. 11. Blatthälfte von deutschem Weidelgras in starker Vergrößerung, das die Rippen, die Bastpartien, welche den Zwischenraum zwischen den Nerven und der Haut auf der Ober- und Unterseite ausfüllen, sowie die großen Oberhautzellen in den Furchen zwischen den Rippen zeigt.



1. Wasserschwaden, Querschnitt durch Blatt und Scheide im Knospenstadium. 2. Wasserschw., Blatteil mit Hohlräumen (h) zwischen den Blattnerven. 3. Wasserschw., oberer Teil der Scheide mit Queradern zwischen den Längsadern. 4. Wasserschw., kleine vergrößerte Partie der Blattscheide. 5. Wasserschw., Blatt- und Stengelpartie mit Blattbasis (das dunkel gezeichnete) sowie Blatthäutchen. 6. Wasserschw., oberer Teil eines Blattes. 7. Mannagras, Querschnitt durch ein Blatt mit Lufthohlräumen (h). 8. Salzschwaden, Querschnitt durch ein Blatt im Knospenstadium. 9. Mannagras, Querschnitt durch ein Blatt im Knospenstadium. 10. Mannagras, Teil von Blatt und Scheide, langes Blatthäutchen. 11. Salzschwaden, Querschnitt durch ein Blatt mit platten, breiten, niedrigen Rippen, die mittlere abgerundet. 12. Salzschwaden, oberer Teil des Blattes, das lichte Streifen längs der Mittelader zeigt. 13. Wasser-Quellgras, Querschnitt durch ein Blatt mit luftefüllten Hohlräumen.



1. Querschnitt durch ein Blatt von Knaulgras mit kräftig entwickeltem Kiel auf der Unterseite.
2. Querschnitt durch ein Blatt von Wiesenrispengras mit „Gelenkzellen“ (S. 7) auf der Oberseite zu beiden Seiten des Mittelnervs. 3. a die Spaltöffnungen auf der Oberseite, b und c auf der Unterseite eines Blattes von jährigem Rispengras zeigend, d Blattpartie von Wiesenrispengras (vergrößert), mit zwei weißen Streifen neben dem Mittelnerv, in durchfallendem Lichte sichtbar.
4. Querschnitt durch ein spärlich behaartes Blatt von Goldhafer. 5. Querschnitt durch ein dicht-behaartes Blatt von wolligem Honiggras.



1



2



3



4

Hülsenfrüchte mit paarigen Blättern, mit Ranke versehen.

1. Vogelwicke. 2. Zaunwicke, beide mit federädri gen („federnervigen“) Blättchen. 3. Wiesen-Platterbse, 4. Sumpf-Platterbse, beide mit „bogennervigen“ Blättchen.



1



2



3



4

1, 2, 3, paarige Blätter mit Endblättchen, 4. dreizählige Blätter.

1. Mäusewicke. 2. Wundklee (großes Endblättchen). 3. Gemeiner Hornklee (zweipaarige Blätter ohne Nebenblätter). 4. Gem. Schneckenklee (Endblättchen mit deutlichem Stiel).



I



2



3



4

Hülsenfrüchte mit dreizähligen Blättern.

1. Rotklee, Nebenblätter breit, plötzlich in eine Granne übergehend. 2. Mittlerer Klee, Nebenblätter lanzettlich. 3. Weißklee mit kriechendem Stengel. 4. Luzerne, mit länglich-keiligen Blättchen.

Buchdruckerei
Otto Regel G. m. b. H.
Leipzig

Schlüssel zur mikroskopischen Bestimmung der Wiesengräser im blütenlosen Zustande.

Für Kulturtechniker, Landwirte, Tierärzte und Studierende. Von Reg.-Rat Dr. Hans **Schindler**, Oberinspektor an der Bundesanstalt für Pflanzenbau und Samenprüfung in Wien. Mit Geleitwort von Professor Dr. Otto Porsch, Vorstand der Lehrkanzel für Botanik an der Hochschule f. Bodenkultur in Wien. Mit 16 Abb. IV, 32 Seiten. 1925. RM 2.10

Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde. Von Dozent Dr. J. **Braun-Blanquet**, Montpellier. (Bd. VII der „Biologischen Studienbücher“.) Mit 168 Abb. X, 330 S. 1928. RM 18.—; geb. RM 19.40

Kleines Praktikum der Vegetationskunde. Von Dr. Friedrich **Markgraf**, Assistent am Botanischen Museum Berlin-Dahlem. (Bd. IV der „Biologischen Studienbücher“.) Mit 31 Abbildungen. VI, 64 Seiten. 1926. RM 4.20; gebunden RM 5.40

Das Mikroskop und seine Anwendung. Von Dr. Hermann **Hager**. Handbuch der praktischen Mikroskopie und Anleitung zu mikroskopischen Untersuchungen. In Gemeinschaft mit Dr. O. Appel, Professor und Geh. Regierungsrat, Direktor der Biologischen Reichsanstalt für Land- und Forstwirtschaft zu Berlin-Dahlem, Dr. G. Brandes, ehemals Professor der Zoologie an der Tierärztlichen Hochschule, Direktor des Zoologischen Gartens zu Dresden, Dr. E. K. Wolff, Privatdozent für allgemeine Pathologie und spezielle pathologische Anatomie an der Universität Berlin, neu herausgegeben von Dr. Friedrich **Tobler**, Professor der Botanik an der Technischen Hochschule, Direktor des Botanischen Instituts und Gartens zu Dresden. Dreizehnte umgearbeitete Auflage. Mit 482 Abbildungen im Text. X, 374 Seiten. 1925. Gebunden RM 16.50

Fortschritte der Landwirtschaft. Zeitschrift und Zentralblatt für die gesamte Landwirtschaft. Erscheint in ständiger Verbindung mit dem Reichsbund akademisch gebildeter Landwirte in Berlin und unter Mitwirkung führender Hochschul-Institute. Unter Mitwirkung von Professor Dr. **H. Kaserer**, Wien, und Regierungsrat Dr. **R. Miklauz**, Wien, herausgegeben von Privatdozent Dr. **E. Tamm**, Berlin. Regelmäßige monatliche Beilage: Betriebswissenschaftliche Blätter für die Praxis. Schriftleitung: Dr. Gg. Feige, Breslau.

Die Zeitschrift erscheint am 1. und 15. jedes Monats. Preis vierteljährlich RM 6.—; Einzelheft RM 1.50.

Österreichische Botanische Zeitschrift. Herausgegeben von Professor Dr. Richard **Wettstein**, Wien, unter redaktioneller Mitarbeit von Professor Dr. Erwin **Janchen**, Wien, und Professor Dr. Gustav **Klein**, Wien. Erscheint vierteljährlich (zwanglos) in einzeln berechneten Heften, die zu Bänden von etwa 320 Seiten vereinigt werden. 4 Hefte bilden einen Band. Preis jedes Heftes etwa RM 8.— bis RM 10.—

Photomount
Pamphlet
Binder
Gaylord Bros. Inc.
Makers
Syracuse, N. Y.
PAT. JAN 21, 1908

Bo

H

245960

Author Henning, Ernst

Title Bestimmungstabellen für Gräser und Hülsenfrüchte im Blütenlosen Zustande.

NAME OF BORROWER.

University of Toronto
Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET

Acme Library Card Pocket
Under Pat. "Ref. Index File"
Made by LIBRARY BUREAU

